




# Mustang™

## HERBITSIID/HERBICIDS/HERBICIDAS

<sup>TM</sup>Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.



### Hoitatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnamuutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H410 Väga mürkigne veeorganismidele, pikajaline toime. P280: Kanda kaitsekindla/kaitserõivastust.

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetundse korral võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ärstiga.

P302+P352: NAHAÄRATMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Naahaärituse või lõöde korral: põõrduda arsti poolte.

P363: Nastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisul/mahuti kõrvaldava vastavalt kohalike eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seade meid pinnavee läheval mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhiide).

Häädaabi telefon 112. Mürgistustebekeskuse lühinumber 16662.

### Toote kasutamisel järgida

Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekatsevahendi kasutamise ja hoikuks täpsmed nööude“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspülvanguid.

### Uzmanību

H302 Kaitfigs, ja norji.

H317 Var izraisits alergijsku ädas reakciu. H410 Loti toksiks vändens organismiemi ar ilgstošam sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai ja videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargiimuds/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORIŠĀNAS GADĪJUMA:

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS

INFORMĀCIJĀS CENTRU/ ja jums ir

slikta pašsājūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar

lielu üdens daudzumu.

P501 Altriviotics no natura/vertvines, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nēpēsānوت üdeni ar augu aizsardzības

līdzekļi ja tā iepakojumi/neiřīt smidzināšanas

tehniku üdenstilpiju ja üdensteču

tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu ja pagalmiņiem ja ceļiem.

SP3 Lai aizsargātu üdens organismus,

ievērot 10 m aizsargjoslu līdz üdenstilpēm un

üdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsibas ja glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bēriņi nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem ja lopbarības. Uzglabāt no salas pasargātās vietās.

### ATSARGIAI

Kenksmingas paraju.

Gali sukelti alergijsku ädas reakciu.

Labai toksisks vändens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ja aplinkai keliamos risikos, būtina vykydīti naudojimo instrukcijos nurodytumus.

Stengtis neijkvēpti rūko/garu/aerozolio.

Mūvēti apsaugines pīrstines ja devēti apsauginius drabužius.

Jeigu sudringinama oda arba ja išberia: kreiptis ja gydytoja.

Nusivilkli užtervetus drabužius ja išskalbiti prieš vēl juud apsivelkart.

Surinkti ištekėjusių medžiagą.

Talpyklā šalinti pagal nacionālinius teisēs aktu reikalavimus.

Neužtersti vändens augalu apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti pušķimo īrenginu šallia paviršinio vändens telkinij/vengti taršos per drenāžu ja sodybu ar nuo keliu).

Siekiant apsaugoti vändens organismus, būtina iššaikyti 1 metro apsaugos zonai iki paviršinio vändens telkinij ja melioracijos groovi.

### Apsienuodijimo atveju kreiptis i

Apsienuodijumi kontroles ja informacijas biura telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIESENNAUDOJIMĀ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJAI

EE Kasutusvaldkond. Kaheuleheliste umbrohtude töörje suvi- ja taliteraviljad (v.a. kaer).

Toode võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

### Toimeained:

Florasulams 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Säiliivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV Sistēmas iedarbības herbicids ismūža un daudzgadigo dividiglapju nezālu ierobežošanai ziemas kvešu, ziemas miežu, rudu, tritikāles, vasaras kvešu, vasaras miežu ja auzu sējumos.

### Darbigās vielas:

florasulams 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera forma (300 g 2,4-D skābes ekvivalenta forma/l)

Preparatiiv forma: suspo - emulsija

Reģistrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/zigatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Deriguma termins: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusiomis vienamērēm ja kurioms daugiametēms dviskilomestruks pikkjelēms naikinti ūžeminius ja vasarinius kvečiuse, vasarinius mežiūose. Labai gerai naikina ūžas pikkjelēs: kibiosius lipikus, ramunes, daržines liliūges, dirvines usnis, rapso pabiras ja kitas dviskiltes pikkjelēs.

Preparatas skirtas profesjonaliajam naudojimui.

Veiklosios medžiagoss:

florasulams 6,25 g/l

2,4-D 2-etilolehoksilo-esteris 452,5 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

Reģistrācijas Nr.: 0212H06

Slūntos Nr.: žūrēti ant pakuočes.

Pagaminimo data: žūrēti ant pakuočes.

Gallojimo laiks: 3 metai.

### Preparata registravo:

Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K, Danija

Dow AgroSciences Danmark A/S

konsultants Latvijā: Corteva

Agriscience, The Agriculture

Division of DowDuPont.

Tel. +371 2897 5155



Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L

**Lietošanas instrukcija latviski sekō pēc teksta igaunu valodā.**  
**Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikiami po estišķu ir latvišku tekstu.**

**Kasutamisõpetus**

**Toimevīls**

Mustang on süsteemne herbisiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülester, mis omastatakse taimede lehetele kaudu. Florasulaam peatab taimede aminohapete sünteesi ja 2,4-D etüülehksülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärel ei saa taimerakud enam jaguned.

**Ilmastiuktingimused pritsimise ajal**

Mustang'i kasutatakse tärganud umbrohuste töreks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasis kuni teise körresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Pritsitarvumine ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

**Doseerimine ja pritsimise ajastamine**

Kultuurid	Kulunorm	Törjespektter
Törje sugi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer)	0,4-0,6 l/ha	<p><b>Väga hea törjeeefekt:</b> rukkiliil, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, pöldohakas, vim.e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, pöld-litterhein, kesalill, pöld-löösim, pöldriögas, pöldsinep, raps võõrkultuurina.</p> <p><b>Keskmine törjeeefekt:</b> pöldkannike, verev imriñoges, völliil, pöldosi, kare kõrvik, piimalill.</p> <p><b>Rahulad törjeeefekt:</b> harilik punand.</p>

**Muld**

Herbisidi Mustang võib kasutada eri tüüpi pinnasel.

**Vihmakindlus**

Mustangi vihmakindlus normaaltingimustes on 1 tund.

**Pritsimisvõtted**

Herbisidi Mustang saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsiiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu.

Soovitavat pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimishinikat. Minimaalne soovitavat pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

**Pritsimislahuse valmistamine**

Enne preparaatide kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmisseadme kasutamine: Kasutades Mustang'i, täitke täitmisseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pritspaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejäänen kogus puhas vett. Seejärel loputage täteseade ning tühjad anumad, kui neid on. Korrale alumise ventili avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täitemeade ei ole silmaga nähtavaid jälgi Mustang'i.

Vahetu sissememine: Kui te kasutate vahetu sissememisse seadet, juhige lahjendamata toode olse torudesse, mis lähevad pritsipaagist pihustiteni. Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

**Paagi puhastamine**

Sõltumata täteseadeest pritsitakse pritsimislahuse jäädig ja loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jäake vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaaik koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveepaagist párineva veega. Soovitatav on jagada loputusvesi erinevate loputustele vahel ning korraga paagi pesu ja pihustamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

**Pritsi väline puhastamine**

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal pööll, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud pööll, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

**Paagisegud**

Mustang'i võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon<sup>®</sup> Forte, Juventus<sup>®</sup> 90, Tilt<sup>®</sup> 250 EC, Artea<sup>®</sup> 330 EC, Allegro<sup>®</sup> Super, Folicur<sup>®</sup>, Corbel<sup>®</sup>, Tang<sup>®</sup> Super; insektiisiidiga Fastac<sup>®</sup> 50, Decis<sup>®</sup> Mega, kasvuregulatoriga CCC<sup>®</sup> ja lehevälétistega nagu X-lehevälatis ja Super lehevälatis.

**Etevaatusabinõud**

Mustang'i te tohi kasutada libliköölistel allakülvide korral.

**Järgnevad kultuurid**

Järgneval aastal võib samal pööll kasvatada kõiki kultuure.

**Ümberkylv**

Kui Mustang'i pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale pööllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi.

**Holutingimused**

Hoida ainult originaalkendis, varustatuna etiketiga, tihealt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otsests pääkesekirguse ja soojuusliku eest, vältida preparaadi kulumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaadatus kohas. Hoida eemal töidust, joogist ja loomasööst.

**Taara kahjustustamine**

Tühjad pakendid loputavad 3 korda puhta veega ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Mahavalgund preparaat koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Tähelepanu!**

Kõik meie poolt tarinatavad tooted on kõrge kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobivuses, kuid kuna meil puudub kontroll nende säilitamise, käsitsimise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastiuktingimuste üle, ei rakendu neile seadusandlusdest tulevandat või muud kinnitused, tingimusel või tagatised, mis puudutavad meie toodete rahulatvust kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamisel, käsitsimisel, rakendamisel või kasutamisel tingitud ebaturmeliikus, kahju või vigastus ei kuulu ei meie ega edasimüüjate vastutusalasse. Meie töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutma, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamisega järelvaatamise või abiastamise kaudu seotud.

<sup>®</sup>TM Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

<sup>®</sup>Bayer CropScience A.G.

<sup>®</sup>BASF

<sup>®</sup>Adama

<sup>®</sup>Syngenta Agro Service Ag

<sup>®</sup>Nufarm

## Pirmā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekošā ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acis, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo sveigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija.

Jebkurā gadījumā vēlamanā ārsta konsultācija. Uzrādīet ārstanam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindešanās informācijas centra tālruni numurs: 67042473

## Drošības prasības un personāla drošība:

Sargāt no bēriem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargķerpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķimiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilk apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

## PREPARĀTA IEDARBĪBAS VEIDS

**Mustangs s.e.**, ir sistēmas iedarbības herbicīds, kurš tiek absorbēts galvenokārt caur lapu sistēmu. Darbīgā viela - florasulams bloķē fermenta acetolaktāzē sintēzi, savukārt darbīgā viela 2,4-D darbojas kā aukšinu tipa herbicīds, ierosinot strauju šūnu daļišanos augā. Nezāļu augšana tiek apstādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirms preparāta iedarbības simptomas uz nezālēm var novērot pirmās nedēļas laikā pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmišana notiek aptuveni trīs nedēļu laikā.

Herbicīdam ir augsta efektivitāte uz kēraiļu madaru (*Galium aparine*), kumeleti (*Matricaria spp.*), virzu (*Stellaria media*), tiruma usni (*Cirsium arvense*), rapsi - sārnuaugu un citām nezālēm.

## EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM

### Ļoti jutīgas nezāles (> 95 %)

zila rudzupuke (*Centaurea cyanus*), baltā balanda (*Chenopodium album*),

lauka mīkstiene (*Sonchus arvensis*),

tiruma neaizmirstuļi (*Myosotis arvensis*),

tiruma usne (*Cirsium arvense*),

kēraiļu madara (*Galium aparine*),

tiruma virza (*Stellaria media*),

zīda magone (*Papaver rhoeas*),

blusu sūrenie (*Polygonum persicaria*),

dārza vējgrīks (*Polygonum convolvulus*),

tiruma līzle (*Anthemis arvensis*),

tiruma naudulis (*Thlaspi arvense*),

kumelete (*Matricaria spp.*),

ganu plikstiņš (*Capsella bursa - pastoris*),

tiruma pērkone (*Raphanus raphanistrum*),

tiruma sinepe (*Spinapis arvensis*),

rapsis - sārnuaugus

### Jutīgas nezāles ( 85 - 95 %)

lauka vijoļite (*Viola arvensis*),

sārtā panātre (*Lamium purpureum*),

ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*),

veronika (*Veronica spp.*),

tiruma kosa (*Equisetum arvense*),

parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*),

tiruma dievkreslīns (*Euphorbia helioscopia*).

## Zemas jutības nezāles ( 50 -85 %)

ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*)

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

**Mustangs s.e.** lietošanu var sākt agri pavasarī, veģetācijas sākumā pie gaisa temperatūras virs +5°C. Optimālais apstrādes laiks graudaugiem no 2-3 lapu stadijas līdz otrā mezglu stadijai (AS 13-32). Nezālēm apstrādes laikā vēlams būt ne lielākām kā 2 - 4 lapu stadijā.

**Mustangs s.e.** var lietot visu tipu augsnēs.

## LIETOŠANAS DEVAS

Kultūraugs	Lietošanas deva	Lietošanas laiks
Ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas mieži, tritikāle	0,4 – 0,6 l/ha	Pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot no ziemāju graudaugu cerošanas stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 25-32). Iespējami tvertnes maišumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	0,4 – 0,6 l/ha	Apmidzināt sējumus pavasarī, no kultūrauga 2-3 lapu stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 13-32). Iespējami tvertnes maišumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.

**Mustangs s.e.** ir lietus noturīgs 2 stundas pēc izsmidzināšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

## ŪDENIS DAUDZUMS

Rekomendējamais ūdens daudzums uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

## SAVIETOJAMĪBA

**Mustangs s.e.** var izmantot tvertnes maišumos ar citiem herbicīdiem, izņemot augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur etil-fenosakropu-P, klonidinafop-propargilo-P, butil-fluazifopu-P un citas darbīgās vielas no šīs ķimiskās grupas. Tvertnes maišumus var veidot ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar firmas pārstāvi Latvijā.

## UZMANĪBU

Aizliegts lietot **Mustangs s.e.** sējumos ar tauriņziežu pasēju.

Nerekomēdējām preparātu lietošanu, ja: apstrādes laikā gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +25°C, kultūraugs ir bojāts sala vai citā iemesla dēļ, apstrādājamas kultūraugs ir mitrs, ir gaidāmas naktis salnas vai ir ilgstošs sausums, nezāles nav aktīvi augošas.

## ATKĀRTOTA SĒJA UN SEKOJOŠĀS PĒCKULTŪRAS

Ja sala vai citu iemeslu dēļ ir ciets ar **Mustangs s.e.** apstrādātus kultūraugs, tā vietā pavasarī drīskt pārsēt graudaugus vai kukurūzu.

Pēc **Mustangs s.e.** lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē. Tas attlecas gan uz vasarājiem, gan uz ziemājiem.

## DARBA ŠĶIDUMA SAGATAVOŠANA

Piepildit smidzinātāju tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maišītāju, pievienojiet vajadzīgo **Mustangs s.e.** daudzumu, pēc tam paredzēto tvertnes maišuma komponentu un, nepārtraucot maišīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu.

## SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TIRĪŠANA

Pēc jebkura pesticīda izsmidzināšanas: izskalot tvertni / smidzinātāju tūlit pēc smidzināšanas darba beigšanas vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnies nepiekalstu, pat gadījumā, ja kāds no augu aizsardzības līdzekļiem tiks izmantots nākošajā dienā. It īpaši emulsijas koncentrāti un mikrodevu preparāti var veidot uzkļājumus tvertnē, no kurām piekalšanas gadījumā ir ļoti grūti atbrīvoties.

## **Smidzināšanas iekārtas tīrišana pēc Mustang s.e. lietošanas:**

Pirms smidzinātājs tiek lietots citos kultūraugos, izņemot graudaugos, iekārtai jābūt rūpīgi iztīrītai no jebkura veida **Mustang s.e.** atlikuma.

### **Smidzinātāja tīrišana ar uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām**

1. Iztukšojet smidzinātāju uz lauku pilnībā.
2. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām izmazgājet smidzinātāju ar tīru ūdeni, kā arī nomazgājet to no ārpuses. Iztukšojet smidzinātāju, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā laukā.
3. Piepliešiet smidzinātāju tvertni ar ūdeni – 10-15% no tvertnes ietilpības (100-150 litrus ūdens 1000 litru ietilpības tvertnē) un pievienojiet 0,5 litrus All Clear Extra vai līdzīgu produktu uz 100 litriem ūdens. Izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām, lai tās samitrinātu. Iesišķelet maiņas laikā un tvertnes mazgāšanas sprauslas uz vismaz 15 minūtēm. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.
4. Sprauslas un filtri jāņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalokļojiet tvertni ar tīru ūdeni 5 minūtes. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.

### **Smidzinātāja tīrišana bez uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām**

Atšķirībā no iepriekš 3. punktā minētā ūdens daudzuma - 10-15% no tvertnes ietilpības - šādā gadījumā tvertne ir pilnībā jāpiepilda ar ūdeni.

Jārūpējas, lai skalošanas ūdens nonāku kontaktā ar visu tvertnes iekšējo virsmu.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmanot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārnošanas. Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvu. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārnoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **TUKŠĀ TARA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

**Deriguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas gadījumā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Mustang - naudojamas pavasari, sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kvečiuose, ir vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabirias ir kitas dviskiltės piktžoles.

## VEIKIMAS

Mustang - tai sisteminis herbicidas, susidedantis iš dviejų veikliųjų medžiagų: florosulamuo ir 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris. Herbicido veikiosios medžiagos į piktžolęs patenka per lapus. Florosulamas sustabdys piktžolių amino rugščių sintezę, o 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris veikia, kai auksinu grupės herbicidas, sustabdantis piktžolęs laštelių augimą.

## PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDUI

### Labai jautrios piktžolės: (> 95 %)

Rugiaigėlės (*Centaurea cyanus*)

Baltosios balandos (*Chenopodium album*)

Dirvinės pienės (*Sonchus arvensis*)

Dirvinės nemiršelės (*Myosotis arvensis*)

Dirvinės usnys (*Cirsium arvense*)

Kibieji lipikai (*Gallium aparine*)

Daržines žliūges (*Stellaria media*)

Aguonos (*Papaver spp.*)

Démétejų rūgčiai (*Polygonum persicaria*)

Vijokliniai rūgčiai (*Polygonum convolvulus*)

Dirviniai bobramuniai (*Anthemis arvensis*)

Dirvinės čiužutės (*Thlaspi arvense*)

Ramunės (*Matricaria spp.*)

Trirkertės žvaginės (*Capsella bursa - pastoris*)

Dirviniai ridikai (*Raphanus raphanistrum*)

Garstukai (*Sinapis arvensis*)

Rapso pabirios

### Jautrios piktžolės:

Dirvinės našlaitės (*Viola arvensis*)

Raudonžiedės notrelės (*Lamium purpureum*)

Paprastos kiaulpienės (*Taraxacum officinale*)

Veronikos (*Veronica spp.*)

Dirviniai asisiukliai (*Equisetum arvense*)

Dirvinės aklės (*Galeopsis tetrahit*)

Dirvinė karpažolės (*Euphorbia helioscopia*)

### Slipnai jautrios piktžolės:

Vaistinės žvirlilarūtės (*Fumaria officinalis*)

## NAUDOJIMO LAIKAS

Mustang yra labai selektivus herbicidas naudojamas, pavasarį sudygusiom piktžolėm naikinti javuose. Herbicidas turi ilgą naudojimo periodą, prasidedant vegetacijos pradžioje, kai oro temperatūra yra +5°C. Javai purškimo metu turėtų būti nuo dviejų lapelių stadijoje iki antro bambilio stadijos. Piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 2-4 lapelių.

## NAUDOJIMO NORMOS

Žieminiuose javuose (žieminiuose kvečiuose) **0,4 - 0,6 l/ha**.

Vasariniuose javuose (vasariniuose kvečiuose ir miežiuose) **0,4 - 0,6 l/ha**.

Didesniųjų normų purkštai kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.

Purškiamai ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną.

## ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Mustang galima pradžiai purkštai, kai oro temperatūra purškimo metu yra +5°C. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vejo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Lietus 1 valanda po purškimo, herbicido efektyvumui įtakos neturi.

## TIRPALO KIEKIS

Rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalą.

## TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusė purkštuvu talpos pripilama vandens. Ijungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Mustang kiekis. Po pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Kai naudojami mišiniai su milteliai ar granulių tipo preparatais, šie preparatai pirmiausia pilami į purkštuvą talpą ir maišomi kol ištirpsa. Tik po pilamas Mustang. Pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišytuvas turi būti įjungtas purškimo metu.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenančių bei negyvenančių pastatų teritorijas.

## SELEKTYVUMAS

Mustang yra visiškai selektivus žieminiams ir vasariniams javams.

## MAIŠYMAS

Mustang gali būti maišomas su fungicidais, augalų augimo regulatoriais ir mikroelementinėmis trašomis naudojamomis papildomam patrėšimui per lapus. Pastaba: prieš ruošiant mišinį su kitais pesticidais, būtina susipažinti su komponento rekomendacijomis maišymui.

## JSÉLIS

NENAUDOTI Mustang JAVUOSE SU ANKŠTINIŲ AUGALŲ JSÉLIAIS.

## KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ÜKIO AUGALAI

Sudarant sėjomainas nėra jokio apribojimo rudenį arba pavasari sėjamiems žemės ükio augalamams, laukuose pavasari purkštuse herbicidu Mustang.

## ATSÉJIMAS

Atséjant žuvusiu pasėlius, Mustang purkštuse laukuose gali būti sėjami javai ir kukurūzai.

## PURKŠTUVU PLOVIMAS

Prieš purškiant ne javus, kad nebūtų pakentta kitiems purškiamiesiems žemės ükio augalamams, purkštuvu vidų ir išorę reikia gerai išplauti.

Rekomenduojama naudoti purkštuvų plovimo priemonę All Clear Extra™.

## SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su produkту, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystuju chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) p.vz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir.

**Darbutojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai iššūvius. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškiniai ilgomis rankovėmis, avėti sandarūs batus bei rekomenduojama mygti viršutinių pirštinių.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprireinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sulaikojo su produkту. Stengis neįkvėpti rūko, garu ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su miliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankę. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## **PIRMOJI PAGALBA**

**Ikvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nulikti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarūbus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytoju:** konkretaus priešnuodžio néra. Taikyti simpтомinį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

## **SAUGOJIMAS**

Mustang turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisykliemis. Laikykite preparatą vésiose, sausose, gerai védinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Mustang turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

## **TUŠČIŲ PAKUOCIŲ SUNAIKINIMAS**

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produktu likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integratuoti skalavimo arba trīgubo skalavimo metodai. Purkštuvė integruoja pakuočių skalavimo įtaisas pakuočes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trīgubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuočės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiekytų visus pakuočės kampelius. Tuomet skalavimo skyštį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodis švariai.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdrosto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuočės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produktu pakuočės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštėles).

## **PASTABA**

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygomis, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu.

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

## **REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI**

Mustang, - Dow AgroSciences, Danmark A/S

All Clear Extra™ – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

EE



LV



LT

#### Hoitatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317: Või põhjustada allergilist nahareaktsooni.

H410 Väga mürkigne veeorganismidele, piikaaljine toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetund korral võtta viitvamatata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ärstiga. P302+P332: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaarituse või lõöbe korral: põõrduva arsti poolle.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesti.

P501: Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmest pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

Häädaabi telefon 112. Mürgistustebekeskuse lühinumber 16662.

#### Toote kasutamisel järgida

Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoikohaa täpsemad nouded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiirianguid.

#### Uzmanību

H302 Kaitsigs, ja norij.

H317 Vai izraisib alerģisku ädas reakciu.

H410 Lõti toksisks üdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska clivēku veselībai ja videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsardzēbas.

P301+P312 NORIŠANAS GADIJUMA:

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ärstu ja jums ir slikta pašasajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu üdens daudzumu.

P501 Atbrivoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārnot üdeni ar augu aizsardzības līdzekļi ja tā iepakojumu/netiņi smidzināšanas tehniku üdenstipju un üdenstētu tuvumā/izsāgtāies no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SP2 Ei lāzisārtū üdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz üdenstipēm un üdenstecēm.

Avirājas gadījumā ziņot ugunsdzēsibas un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bēriņiem nepieejamā vieta, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbaribas. Uzglabāt no sala pasargātās vietas.

#### ATSARGIAI

Kenksmings prarijus.

Gali sukulēt alerģisku ädas reakciu.

Labai toksisks vandens organismiem, sukulē ilgstošām sekām.

Siekiant išvengi žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos riskos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuodrynumis.

Stengtis nejkvepti rüko/gary/aerozolio.

Mūvēti apsaugines pīrstinges ir devēti apsauginius drabužius.

Jeigu sudruginama oda arba ja išberia: kreiptis į gydytojā.

Nusivalki užteršus drabužius ir išskalbiti prieš vēl juos apsivelkant.

Surinkti šālanti medžiagą.

Talpyklā šālanti pagal nacionalinius teisės aktu reikalavimus.

Neuzteri vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo īrenginjy šalia paviršinio vandens telkinii/vengti taršos per drenāžu iš sodybų ar nuo keliu).

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinjų ir melioracijos grobiū.

#### Apsinuodijimo atveju kreiptis j.

Apsinuodijumi kontrole ū informacijas biurā telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

CORTEVA™  
agricience

# Mustang™

## HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

TM™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude töre suvi- ja taliteravijadel (v.a. kaer).

Toodeet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säiliusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV

Sistēmas iedarbības herbicīds ismūža un daudzgadigo divdigļlapju nezāju ierobežošanai ziemas kvešu, ziemas miežu, rudzu, tritikales, vasaras kvešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgas vielas:

florasulam 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera formā

(300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formā/l)

Preparati vorma: suspo - emulsija

Registrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums:

skatit uz iepakojuma.

Deriguma terminš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Mustang® - tai sisteminiis herbicidas, skirtas sudugusiomis vienamērim ir kai kurioms daugiametēm dviskiltēms pikktolesi naikinti žemēniūose ir vasarinuoso kvečiuose, vasarinuoso miežiūose. Labai gerai naikina šias pikktoles: kibiuosis lipikus, ramunes, daržines žiliūges, dirvines usnis, rapso pabarīs ja kitas dviskiltēs pikktoles.

Preparatas skirtas profesjonalajam naudojimui.

Veiklosios medžiagos:

florasulamas 6,25 g/l

2,4-D 2-ethioehksilo-esteris 452,5 g/l

Preparati forma: koncentruota suspensija

Registrācijas Nr.: 0212H/06

Stiunts Nr.: žūrēti ant pakutēs.

Pagamīnimo data: žūrēti ant pakutēs.

Galiojimo laikas: 3 metai.

Preparata registrāvō:

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhaga K, Danija

Dow AgroSciences Danmark A/S

konsultants Latvijā: Corteve

Agriscience, The Agriculture

Division of DowDuPont.

Tel. +371 2897 5155



Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L