



Rexade™ 440

Arylex™ active

HERBICIDAS

®™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

Rexade 440 yra sisteminio veikimo herbicidas, skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose pavasarį. **Skirtas profesionaliajam naudojimui. PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

Veikliosios medžiagos: piroksulamas 240 g/kg (24 %); haloksifenmetilas 104,23 g/kg (10,42 %); florasulamas 100 g/kg (10 %). **Apsauginė medžiaga:** klovintocetas 212,5 g/kg (21,25 %). **Produkto forma:** vandenyje tirpios granulės. **Registracijos Nr.** AS2-102H(2019).

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. **Pagaminimo data:** žiūrėti ant pakuotės. **Galiojimo laikas:** 2 metai. **Preparatą registruo:** Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija. **Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas**

Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel. +370 5 2100260. **Grynasis kiekis:** 0,500 kg

0970550611912

ATSARGIAI Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina

vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerosolio. Mūvėti

apsaugines pirštines/dėvėti

apsauginius drabužius/naudoti

akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu

sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į

gydytoją. **PATEKUS ANT ODOS:** plauti dideliu vandens kiekiu. Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Surinkti ištekėjusią

medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos

zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti

netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 apsaugos zoną iki ne žemės ūkio

paskirties žemės arba naudoti 90% dulksną mažinančius purkštukus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti

purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą

iš sodybų ar nuo kelių). **Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų**

kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.



0970547091912

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Rexade 440 yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, rugių, kvietrugių ir vasarinių kviečių pasėliuose pavasarį. Rexade 440 yra veiksmingas prieš daugelį vienskilčių ir dviskilčių piktžolių, įskaitant dirvinę smilguolę, tuščiąją avižą, kibujį lipiką, dirvinę našlaitę, rugiagėlę, aguoną birulę ir ramunes. Rexade 440 sudėtyje yra haloksifenmetilo, priklausančio sintetinių auksinų grupei, ir florasulamo bei piroksulamo, kurie priklauso acetolaktazės sintezės inhibitoriams (ALS). Visos veikliosios medžiagos yra sisteminio veikimo, augalas produktą pasisavina per lapus. Vizualiai poveikis pasireiškia per 3-4 savaites po purškimo, priklausomai nuo piktžolių jautrumo produktui.

AUGALAI

Rexade 440 gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

NORMA IR NAUDOJIMO LAIKAS

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai:

37,5-50 g/ha + Dassoil

Purkšti pavasarį nuo matomo trečiojo šoninio ūglio iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 23-32).

Didžiausias purškimų skaičius per auginimo sezoną – 1

Vasariniai kviečiai: 40 g/ha + Dassoil

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32).

Didžiausias purškimų skaičius per auginimo sezoną – 1

Veiksmingumas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)	37.5 g/ha + Dassoil	50 g/ha + Dassoil
Labai jautrios piktžolės (>95%)	Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>), vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), dirvinis raguolis (<i>Consolida regalis</i>)	Dirvinė smilguolė (<i>Apera spica-venti</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>), vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), dirvinis raguolis (<i>Consolida regalis</i>), rapso pabiros (<i>Brassica napus</i>), daržinis lipikas (<i>Galium spurium</i>), paprastasis dalgutis (<i>Erodium cicutarium</i>)

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)	37.5 g/ha + Dassoil	50 g/ha + Dassoil
Jautrios piktžolės (85% - 94.9%)	Dirvinė smilguolė (<i>Apera spica-vent</i>), rapso pabiros (<i>Brassica napus</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), apskritalapė notrelė (<i>Lamium amplexicaule</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), persinė veronika (<i>Veronica persica</i>), paprastasis dalgutis (<i>Erodium cicutarium</i>)	Tuščioji aviža (<i>Avena fatua</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), apskritalapė notrelė (<i>Lamium amplexicaule</i>), dirvinė neužmirštuolė (<i>Myosotis arvensis</i>), aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), gebenlapė veronika (<i>Veronica hederifolia</i>), persinė veronika (<i>Veronica persica</i>)

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)	37.5 g/ha + Dassoil	50 g/ha + Dassoil
	Tuščioji aviža (<i>Avena fatua</i>), rugiagėlė (<i>Cyanys segetum</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>), dirvinė neužmirštuolė (<i>Myosotis arvensis</i>), gebenlapė veronika (<i>Veronica hederifolia</i>) daržinis lipikas (<i>Galium spurium</i>)	Dirvinė veronika (<i>Veronica arvensis</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

Veiksmingumas vasariniuose kviečiuose

Piktžolių jautrumas (veiksmingumas)	40 g/ha + Dassoil
Labai jautrios piktžolės (>95%)	Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), tuščioji aviža (<i>Avena fatua</i>), trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>), dirvinė čiūžutė (<i>Thlaspi arvense</i>), daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė smilguolė (<i>Apera spica-venti</i>)
Jautrios piktžolės (85% - 94.9%)	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>)

FITOTOKSIŠKUMAS

Rexade 440 kartais gali sukelti nežymų bei trumpalaikį augalų pageltimą ir augimo sulėtėjimą. Tai neturi jokios įtakos tolimesniam javų augimui, derliui ir jo kokybei.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA

Rexade 440 rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga (PAM). PAM naudojimo normos nurodytos konkrečiau produkto etiketėje.

Dėmesio! Rexade 440 mišinių su PAM poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas. Perskaitykite PAM etiketę prieš naudojimą. Naudojant produktą kartu su PAM, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas naudojamo PAM etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtina pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

MAIŠYMAS

Rexade 440 negalima maišyti su herbicidais, kurių sudėtyje yra fenoksaprop-p-etilo dėl galimo veiksmingumo sumažėjimo. Rekomenduojamas 14 dienų intervalas tarp purškimų.

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos

savininko atstovus Lietuvoje.

Rexade 440 mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų rudenį sėjamiems augalams laukuose, pavasarį purkštuose herbicidu Rexade 440. Tačiau, prieš sėjant jautrius augalus rudenį, tokius kaip ankštiniai augalai, rekomenduojama prieš sėją suarti dirvą.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis nupurkštas Rexade 440 dėl kokių nors priešasčių žuvo, giliai suarus ir praėjus 1 mėnesiui po purškimo, jį galima atsėti vasariniais javais, kukurūzais ir miglinėmis žolėmis. Nerekomenduojama sėti garstyčių.

VANDENS NORMA

Rekomenduojama naudoti 200-400 l/ha vandens.

DARBINIO TIRPALO RUOŠIMAS

Pusę purkštuvu užpildykite vandeniu ir per purkštuvu viršų įberkite reikiamą kiekį Rexade 440 granulių. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvu talpą

likusių vandens kiekiu. Įpilkite reikiamą kiekį PAM. Maišytuvo neišjunkite, kol baigsite purkšti.

Naudokite tik švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priešasčių granulės negali būti subertos į purkštuvu talpą per viršų, o purkštuvu

turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):

- Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.

- Įberkite reikiamą kiekį granulių.

- Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvu talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.

- Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.

Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitinkinkite, kad jis visiškai švarus.

LAIKAS IKI LIETAUS

Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi įtakos Rexade 440 veiksmingumui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tinkamiausias panaudojimo laikas, kai oro temperatūra siekia 5-20 °C. Venkite

atlikti purškimą labai sausomis ir karštomis oro sąlygomis bei prieš šalnas.

Siekiant geriausio rezultato, purškite

Rexade 440, kol piktžolės yra mažos ir ne vėliau nei jos pasiekia 6-8 lapelių tarpsnį.

Rexade 440 gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai yra streso būsenoje, t. y. numatomos šalnos, esant sausrui, užmirkusiai dirvai, nepakankamam kiekiui mineralinių medžiagų dirvoje, stipriam ligų ar kenkėjų antplūdžiui ir kt.

Nenaudokite javų pasėliuose su ankštinių (pvz., dobilų) ir miglinių žolių įsėliu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Rexade 440 sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos: florasulamas ir

piroksulamas, kurios turi vienodą ALS¹ (acetolaktazės inhibitoriai) veikimo pobūdį, ir haloksifenmetilas, kuris priklauso sintetinių auksinų grupei.

Atsparumo išsivystymo rizika vienskiltėms piktžolėms yra didelė, tačiau dėl haloksifenmetilo ir florasulamo, kurie naikina dviskiltės piktžolės, atsparumo išsivystymo rizika yra maža.

Florasulamas ir piroksulamas, remiantis HRAC klasifikacija, priklauso triazolpirimidinų grupei, HRAC kodas B, todėl reikia imtis atsargumo priemonių šiai rizikai sumažinti. Haloksifenmetilas yra priklauso arilpikolinatų grupei, HRAC kodas B, atsparumo išsivystymo rizika sintetiniams auksinams laikoma maža. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis.

Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai nesunaikinamas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, Dow AgroSciences

pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės.

Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

5. Vienskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

PURŠKIMO TECHNIKA

Rexade 440 turi būti išpurškamas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniiais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., All Clear Extra™. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Plovimui naudotą tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. All Clear Extra™ - FMC Agricultural Solutions prekės ženklas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines

(atitinkancias standartą LST EN 374):

pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkancias standartą LST EN 166)..

Purškiant traktoriniais lauko

purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius

– kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku

ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš

medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba

medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei

avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštovo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkancias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus.

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams

neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti bet kokio sąlyčio su produktu.

Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos.

Po darbo ar prieš pertrauką

nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu

su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos

apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia

kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių

apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų

reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis

sąmoningas: skalauti burną vandeniu,
duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens.

Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis
į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę
arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus

priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų

kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5

2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos
temperatūros šaltinio.

Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0° -
30°C.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo

įrangą, augalų apsaugos produktų

pakuotės turi būti skalaujamos taikant
integruotojo skalavimo (skalaujant

suspausto vandens srove) ar trigubo

skalavimo metodus. Vanduo,

panaudotas augalų apsaugos produktų

pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės

sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos

produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų

pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą

nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

ATSAKOMYBĖ

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas
neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo
netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto
naudojimo metu nepalankios purškimui.